Reservas de sementes

Embrapa Produtos e Mercado
Escritório de Campinas
Telefone: (19) 3749-8888
Fax (19) 3749-8890
sac@campinas.spm.embrapa.br
www.campinas.spm.embrapa.br

Informações Técnicas

Embrapa Cerrados
cpac.sac@embrapa.br
http://www.cpac.embrapa.br/maracuja/inicio/
http://www.cpac.embrapa.br/publicacoes/publ_index.html
http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoazedo/

Equipe técnica

Equipe dos projetos Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro auxiliados por marcadores moleculares e Melhoramento genético do maracujazeiro *(Passiflora* spp.) visando a sua utilização diversificada e valoração da biodiversidade essencialmente brasileira.

Outras cultivares

http://www.cpac.embrapa.br/maracuja/produtos_tecnologicos/

Apoio Financeiro

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Embrapa

2014
2ª impressão
Tiragem: 200 exemplares
Impresso no serviço gráfico da Embrapa Cerrados

Arte: Wellington Cavalcanti
SIPT - Embrapa Cerrados

CARACTERÍSTICAS DO FRUTO

Frutos amarelos, grandes, com formato oblongo, sendo afilados no ápice e mais arredondados na base. Pesam de 150 a 350 g, apresentam rendimento de polpa em torno de 38 %, e teor de sólidos solúveis de 13 a 14° Brix.

ORIGEM

Foi obtido com base no melhoramento populacional por seleção recorrente e obtenção e avaliação de híbridos intra-específicos. É derivado das matrizes Seleção GA-2 e MA (matriz derivada da seleção Redondão). Seu N.Ref. no Registro Nacional de Cultivares - MAPA é 21716.

DADOS TÉCNICOS

PRODUTIVIDADE

Sua produtividade nas condições do Distrito Federal, com irrigação e plantado no período de maio a julho, no espaçamento de 2,5 m x 2,5 m, tem ficado acima de 40 t/ha no primeiro ano de produção, sem o uso da polinização manual. No segundo ano de produção, essa produtividade fica em torno de 20 a 25 t/ha, dependendo do manejo.

RESISTÊNCIA A PRAGAS E DOENÇAS

Tem tolerância a doenças foliares, como bacteriose, antracnose e virose. É susceptível a doenças causadas por patógenos de solo. Não há informações sobre maiores danos causados por pragas.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DE IMPORTÂNCIA

Resistência ao transporte, coloração amarelo-brilhante do fruto, coloração de polpa amarelo forte (maior quantidade de vitamina C), maior tempo de prateleira e bom rendimento de polpa. Frutos para indústria e mesa.

PERÍODO DE FLORAÇÃO

Ano todo, com maior concentração na época seca.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

Com base nas áreas de avaliação, há indicadores da adaptação da cultivar na altitude de 376 a 1.100 m, latitude de 9° a 23°, plantio em qualquer época do ano (quando irrigado), em diferentes tipos de solo. Não se adapta a regiões sujeitas a geadas.